Défenses contre le cancer: l'apoptose et la sénescence

Gerardo Ferbeyre BCM 3512

L'apoptose est une mort cellulaire programmée

Rôle de l'apoptose:

- Équilibre entre la prolifération cellulaire et la mort cellulaire.
- L'apoptose élimine aussi des cellules en stress ou des cellules potentiellement cancéreuses (mécanisme de suppression tumorale).
- Méthode pour éliminer de façon organisée et non traumatique l'excès de cellules (i.e., la moitié de toutes les cellules nerveuses produites pendant le développement).

Les doigts sont formés par élimination des cellules interdigitales par apoptose

Apoptose versus Nécroses

- Condensation régulière de la chromatine
- Organelles intactes
- Les cellules sont compactes (corps apoptotiques)
- Les cellules apoptotiques peuvent être observées à côté de cellules normales
- Absence de réaction inflammatoire associée

- Condensation irrégulière de la chromatine
- Organelles désagrégées
- Les cellules sont dilatées
- Les cellules sont affectées en groupe
- Réponse inflammatoire

Détection de l'apoptose

Characteristics:

1. Chromatin condensation
2. DNA fragmentation

Inducteurs de l'apoptose

Inducteurs physiologiques:

- Cytokines: TNF, TGF β , Fas-ligand
- Neurotransmetteurs: glutamate, dopamine, NMDA
- Absence de stimulation par les hormones ou facteurs de croissance
- Perte de l'interaction avec la matrice extracellulaire (anoikis)
- Hormones: glucocorticoïdes

Stress:

- Oncogènes: myc, E1A
- Choc thermique
- Calcium
- Virus
- Bactéries
- Radicaux libres
- Drogues (chimiothérapie)
- Radiation (dommage à l'ADN)

Conséquences pathologiques des dérégulations de l'apoptose

- Infections virales
- Cancer
- Maladies autoimmunes

- SIDA
- Maladies neurodégénératives
- Ischémie

Executeurs de l'apoptose

Caspase dépendant

Caspase indépendant:

Cathepsins

Apoptosis Inducing Factor (AIF)

EndoG

Caspases

- Protéases à cystéine qui coupent après Asp.
- Synthétisées en précurseurs inactifs.
- Activées par protéolyse
 - Après Asp.
 - Elimination du pro-domain N-terminal.
 - Formation de tétramères.
- Protéines adaptatrices concentrent les procaspases pour commencer une réaction en cascade protéolytique.
- 14 caspases: 1, 4, 5 et 11 non apoptotique.
- Caspases régulatrices: Caspases 8 et 9.
- Caspases exécutoires: les autres

La cascade des protéases

ACTIVATION BY PROTEOLYTIC CLEAVAGE

(A)

(B)

Rôle des caspases pendant l'apoptose

- Inactivation des protéines anti-apoptotiques (i.e., ICAD).
- Dégradation des lamines: les lamines lient les régions de l'ADN responsables pour la liaison à la matrice nucléaire.
- La dégradation des lamines expose l'ADN à la dégradation par les nucléases.
- Activation des DNases qui fragmente l'ADN.
- Dégradation des protéines du cytosquelette (FAK, PAK).

Les voies de l'apoptose

1) Caspases, 2) Mitochondrie, 3) La famille Bcl2, 4) Stimulation, 5) Les signaux de survie

Les protéines de la famille de Bcl-2

• Membres anti-apoptotiques

(Bcl-x_L, A1, Boo, Bcl-w, Mcl-1, NR13, Bcl-B)

• Membres pro-apoptotiques

(Bak, Bok, Bcl-X_s, Bcl-rambo)

Protéines multidomaines

(Bad, Noxa, PUMA, Bmf)

Protéines
BH3-only

(Bik, Hrk, Blk, NIP3, BNIP3, Bbc3)

2. Les protéines BH3-only, détecteurs des stimuli apoptotiques

Bax induit la libération de cytochrome c

Les “checkpoints” contre le cancer

Lignée cellulaire:
“Checkpoints” mutés

Prolifération

Transformation

Myc, E1A

Cellules primaires
Cellules normales

Facteurs de survie

Apoptose

Facteurs
de survie

Les oncogènes Myc et E2F1 induit l'apoptose p53 dépendente et p53 indépendante

INK4a-ARF → RB / p53 pathway

- Conséquences pathologiques des dérégulations de l'apoptose
- Caspases et leur rôle dans l'apoptose
- Les voies de l'apoptose
- Les protéines de la famille Bcl2
- Mécanisme d'induction de l'apoptose par les oncogènes myc et E2F1

À la prochaine heure de cours

Les défenses contre le cancer: la sénescence

La sénescence: un programme pour éviter les tumeurs

Gerardo Ferbeyre

BCM3512

Types de sénescence

La sénescence prématurée évite l'action des oncogènes

Lignée cellulaire:
"Checkpoints" mutés

Prolifération

Transformation

Ras, Raf, Mek,

Arrêt de croissance

Cellules primaires
Cellules normales

Sénescence

Mécanisme de la sénescence prématurée

- Arrêt permanent de la prolifération cellulaire.
- Expression de médiateurs de l'inflammation
- Contrôlée par Rb, p53 et PML (protéines de suppression tumorale)

- PML contrôle la fonction de Rb et p53 pendant la sénescence

Senescence associated beta galactosidase

La voie de l'ADN endommagé active p53 en réponse aux oncogènes

Hétérochromatine, Rb et sénescence

SAHF_s

Pendant la sénescence Rb catalyze la formation d'une conformation inactive de la chromatine, inaccessible aux Facteurs de transcription

Les tumeurs bénignes sont des accumulations des cellules sénescentes

La sénescence répllicative

Population doublings

Immortal Cells

Senescent Cells

Time in days

Le problème de la réplication des extrêmes

Okasaki Fragments

3' extension

discontinuous ~2,000 bps

continuous

**no room
for primer**

?

L'effet de la télomérase

The end-replication problem is never really solved; telomerase overcomes the problem by restoring overall length

La sénescence répliquative est due à un raccourcissement des télomères

- La plupart des cancers surexpriment la télomerase
- Le gène de la telomerase est réprimé dans la plupart des cellules somatiques humaines

La sénescence et l'apoptose sont des voies finales de réponse au stress

À la prochaine heure de cours

Mitose

La famille des caspases (cystéinyl endoprotéases clivant après un aspartate)

DED : Death Effector Domain

CARD : Caspase Activation and Recruitment Domain

E2F1 et p53

Apôptosis

au cytoplasm

Les “SAHFs” sont un type spécial d’hétérochromatin

SAHF contain methyl K9H3
HP1 proteins
MacroH2A/H2B

Reverse transcription des telomeres par la telomerase

ADN

3'

YYYGTTGGGG

XXXCAACCCCAAXXX

ARN

La telomerase est une reverse transcriptase

- Ribonucleoprotéine
- RNA 159 nts
- CAAUCCCAA
TTAGGG